



## Aktualisierte Liste der Chemnitzer Brutvogelarten und Bestandsschätzung ausgewählter Brutvögel in der Stadt Chemnitz für den Zeitraum 2022-2024\*

**Jens Börner, Dieter Kronbach, Limbach-Oberfrohna, Volkmar Kuschka, Flöha, Gudrun Schneider, Chemnitz & Rico Spangenberg, Jahnsdorf**

### Ausgangssituation und Erfordernis

Im Zeitraum von 1997 bis 2000 und mit Ergänzungen bis 2004 wurden für das Stadtgebiet von Chemnitz die Brutvögel auf Basis einer Rasterkartierung erfasst (Flöter et al. 2006).

Nur für einzelne Arten wurden in den folgenden Jahren Bestandserhebungen über das gesamte Stadtgebiet durchgeführt (z. B.: für Sperber und Habicht, H. Hauck; oder für die Dohle untere Naturschutzbehörde, D. Kronbach, J. Börner, A. Nowak, K. Müller).

Bei vielen Brutvögeln hat es in Chemnitz in den letzten zwei Jahrzehnten deutliche Bestandsveränderungen gegeben. Einige Arten wurden seit längerer Zeit nicht mehr als Brutvögel festgestellt oder haben im Brutbestand erheblich abgenommen. Bei anderen Arten gab es hingegen Bestandszunahmen und es wurden sogar neue Brutvogelarten im Stadtgebiet festgestellt (siehe auch Flöter 2023).

Das Gebiet der Stadt Chemnitz hat sich seit der Erstellung des Brutvogelatlas (Flöter et al. 2006) von 175,81 km<sup>2</sup> auf 221,03 km<sup>2</sup> vergrößert. Die Gemarkungen Wittgensdorf, Röhrsdorf, Gröna und Mittelbach wurden zum 01.01.1999 eingemeindet. Die Stadtfläche hat damit um ca. 26 % zugenommen. Im Brutvogelatlas wurden die Bestände jedoch nur auf der ursprünglichen Fläche von 175,81 km<sup>2</sup> erhoben.

Bei naturschutzrechtlichen Verfahren, insbesondere im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP), sind aktuelle Bestandszahlen der Chemnitzer Brutvögel erforderlich. Diese werden sowohl von der unteren Naturschutzbehörde als auch von beteiligten Gutachtern und Planungsbüros benötigt. Bei einer saP sind grundsätzlich, auf Basis einer Bestandsaufnahme, die vom Vorhaben betroffenen Arten einzugrenzen und deren Beeinträchtigung abzuschätzen. Seltene und gefährdete Arten werden dabei einzeln und vertiefend betrachtet, um Schutz- und Ersatzmaßnahmen festzulegen. Dies basiert auf folgenden Grundlagen:

- der Roten Liste der Brutvögel Sachsens (LfULG 2015),
- dem Anhang 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie,
- der Einstufung durch das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG 2024) als Vogelart mit hervorgehobener artenschutzrechtlicher Bedeutung und
- des Anteils an der Gesamtpopulation im Gebiet der Stadt Chemnitz (1-Prozent-Regel).

Mit der 1-Prozent-Regelung werden auch lokal seltene Vogelarten betrachtet und somit berücksichtigt, welche nicht unter die zuvor genannten Kategorien fallen. Werden in einem Vorhabengebiet mindestens -1 Prozent vom Gesamtbestand einer Brutvogelart erfasst, erfolgt für diese Vogelart auch eine vertiefende Betrachtung (z. B.: In einem Vorhabengebiet wurden zwei Brutreviere der Haubenmeise erfasst. Der Gesamtbestand dieser Art im Stadtgebiet liegt bei 100-150 Brutpaaren (siehe Tabelle). Für die Haubenmeise erfolgt somit eine vertiefende Betrachtung). Für diese Beurteilung und die Berücksichtigung lokal seltener Vogelarten sind aktuelle Bestandszahlen unabdingbar.

Anschrift des korrespondierenden Autors

Jens Börner, Stadtverwaltung Chemnitz, Umweltamt Chemnitz; untere Naturschutzbehörde

"veröffentlicht am 11.08.2025 unter [www.Chemnitz.de/Umweltinfo](http://www.Chemnitz.de/Umweltinfo)

## Methodik

Es wird davon ausgegangen, dass in Chemnitz in absehbarer Zeit keine standardisierte und flächen-deckende Brutvogelkartierung erfolgt.

Um dennoch eine schnelle und effiziente Lösung zu finden, um für die oben genannten Aufgaben verlässliche Daten zugrunde legen zu können, wurde auf das Verfahren einer Expertenbefragung zurückgegriffen. Für die Bestandsschätzung ausgewählter Brutvögel der Stadt Chemnitz wurde für den Zeitraum 2022-2024 eine vereinfachte Form des Delphi-Verfahrens (Culs 2019) angewendet.

Für die Befragung wurden fachkundige Ornithologen um Mitarbeit gebeten, die seit mindestens zehn Jahren im Stadtgebiet von Chemnitz Brutvogelbestände erfassen, naturschutzfachliche (ornithologische) Gutachten erstellen oder an vogelkundlichen, behördlichen und ehrenamtlichen Projekten arbeiten und somit die fachlichen Voraussetzungen besitzen, für eine größere Anzahl von Vogelarten deren Häufigkeiten zu schätzen. Von den sechs angefragten Ornithologen haben sich vier an der Expertenbefragung beteiligt.

Zunächst wurde auf der Grundlage des Chemnitzer Brutvogelatlas eine aktualisierte Liste erarbeitet und eine Auswahl an Vogelarten (seltene und mittelhäufige Arten) getroffen, für die eine Schätzung des Brutvogelbestandes durchgeführt werden sollte. Von den beteiligten Ornithologen erfolgte dann eine Schätzung des minimalen und maximalen Bestandes. Dabei war vorgegeben, sich nicht mit den anderen beteiligten Fachkollegen über die zu schätzenden Bestandszahlen auszutauschen oder abzustimmen.

Aus den geschätzten Minimal- und Maximalwerten aller Beteiligten wurden die Mittelwerte berechnet. Diese Werte wurden unter Beachtung vorhandener Kartierungen (zum Beispiel Dohle, Sperber, Habicht, Wanderfalke) in einem Meeting besprochen und ein möglicher Brutbestand für den Zeitraum 2022-2024 (in der Regel: Minimum, Maximum; in Ausnahmefällen ein Einzelwert) festgelegt.

An der Expertenbefragung haben mitgewirkt: Dieter Kronbach (Limbach-Oberfrohna), Dr. Volkmar Kuschka (Flöha), Dr. Rico Spangenberg Jahnsdorf) und Jens Börner (Chemnitz).

## Ergebnis

Grundsätzlich wird festgestellt, dass die hier vorliegenden Ergebnisse eine vollständige und standardisierte Brutvogelkartierung weder ersetzen können noch sollen. Die unter Anwendung des Delphi-Verfahrens ermittelten Ergebnisse, dargestellt in der nachfolgenden Tabelle, sind jedoch für die oben genannte naturschutzrechtliche Prüfung ausreichend und zeigen aktuelle Entwicklungen und Trends im Chemnitzer Brutvogelbestand auf. Diese Ergebnisse können auch für Naturschutz- und Biotopschutzmaßnahmen verwendet werden oder bei der Planung und Vorbereitung von Artenhilfsmaßnahmen Anwendung finden.

Die Tabelle listet alle 141 jemals im Stadtgebiet nachgewiesenen und wahrscheinlichen Brutvogelarten auf. Unterschieden und farblich hervorgehoben werden:

- Regelmäßige Brutvögel (jährlich brütend oder mit bis ca. fünf Jahren ohne Brutnachweis), darunter auch der Wendehals (vor 2004 erloschen seit 2015 regelmäßig brütend): 103 Arten
- Brutvögel, die ab 2004 neu nachgewiesen wurden (vgl. Flöter et al. 2006 und Flöter 2023): 7 Arten (Drosselrohrsänger, Gänsesäger, Mandarinente, Mittelspecht, Nilgans, Tafelente und Wanderfalke)
- Sporadische Brutvögel (einmaliges oder wiederholtes Brüten aber mit Unterbrechungen von über fünf Jahren): Braunkehlchen, Fichtenkreuzschnabel, Flussregenpfeifer, Graumammer, Lachmöwe, Wespenbussard sowie (vor 2004 erloschen, jetzt wieder Brutvogel): Jagdfasan und Sperbergrasmücke, insgesamt 8 Arten
- Wahrscheinliche Brutvögel (zur Brutzeit im Gebiet anwesend und in der näheren Umgebung des Stadtgebietes brütend, jedoch ohne sicher belegte Brutnachweise für das Stadtgebiet: 8 Arten (Graugans, Rohrweihe, Schnatterente, Schwarzstorch, Uhu, Waldschnepfe, Wasser-ralle, Wiedehopf)
- Ehemalige Brutvögel (Jahr des letzten Brutnachweises in der Tabelle angegeben): 15 Arten (Beutelmeise, Birkhuhn, Halsbandschnäpper, Haubenlerche, Kanadagans, Kiebitz, Knäkente, Raubwürger, Raufußkauz, Rebhuhn, Steinkauz, Steinschmätzer, Tüpfelsumpfhuhn, Wiesenpieper, Ziegenmelker)

Für 94 Brutvogelarten wurde die kurzfristige Bestandsentwicklung (seit 2010) eingeschätzt:

- kurzfristig Zunahme: 28 Arten
- kurzfristig Abnahme: 33 Arten
- kurzfristig kein Trend erkennbar: 33 Arten

Die Gruppe der „ehemaligen Brutvögel“ erhöhte sich nach 2004 um 8 Arten auf 15 Arten.

Die Tabelle enthält zudem Bestandschätzungen für die einzelnen Arten. Die Zahlen für den Zeitraum von 1997 bis 2000 basieren auf den Angaben von Flöter et al. (2006), die Zahlen für den Zeitraum von 2022 bis 2024 basieren auf den aktuellen Einschätzungen der genannten Experten. Für diese Periode wurden die Einschätzungen nicht bei allen Arten vorgenommen.

| Artnamen (deutsch)   | Artnamen (wissenschaftl.)        | Brutbestand<br>1997-2000 (2004) | geschätzter<br>Brutbestand<br>2022-2024 | Status     | Trend |
|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| Amsel                | <i>Turdus merula</i>             | 6.000-7.500                     |                                         | Bv         | k     |
| Bachstelze           | <i>Motacilla alba</i>            | 300-400                         |                                         | Bv         | k     |
| Baumfalke            | <i>Falco subbuteo</i>            | 0-1                             | 2-4                                     | Bv         | u     |
| Baumpieper           | <i>Anthus trivialis</i>          | 140-180                         | 40-60                                   | Bv         | a     |
| Beutelmiese          | <i>Remiz pendulinus</i>          | 0-1                             | 0                                       | eBv (2004) | k     |
| Birkenzeisig         | <i>Carduelis flammea</i>         | 100-140                         | 5-15                                    | Bv         | a     |
| Birkhuhn             | <i>Tetrao tetrix</i>             | 0                               |                                         | eBv (1931) | k     |
| Blässhuhn            | <i>Fulica atra</i>               | 25-35                           | 40-50                                   | Bv         | u     |
| Blaumiese            | <i>Parus caeruleus</i>           | 2.300-3.400                     |                                         | Bv         | k     |
| Bluthänfling         | <i>Carduelis cannabina</i>       | 200-270                         |                                         | Bv         | k     |
| Braunkehlchen        | <i>Saxicola rubetra</i>          | 2-4                             | 0-1                                     | sBV        | a     |
| Buchfink             | <i>Fringilla coelebs</i>         | 1.800-2.800                     |                                         | Bv         | k     |
| Buntspecht           | <i>Dendrocopos major</i>         | 400-550                         |                                         | Bv         | k     |
| Dohle                | <i>Coloeus monedula</i>          | 200-260                         | 100-120                                 | Bv         | a     |
| Dorngrasmücke        | <i>Sylvia communis</i>           | 250-350                         |                                         | Bv         | k     |
| Drosselrohrsänger    | <i>Acrocephalus arundinaceus</i> | 0                               | 1-5                                     | Bvn        | u     |
| Eichelhäher          | <i>Garrulus glandarius</i>       | 500-700                         |                                         | Bv         | z     |
| Eisvogel             | <i>Alcedo atthis</i>             | 0-1                             | 4-6                                     | Bv         | z     |
| Elster               | <i>Pica pica</i>                 | 750-850                         |                                         | Bv         | a     |
| Erlenzeisig          | <i>Carduelis spinus</i>          | 10-30                           | 10-15                                   | Bv         | a     |
| Feldlerche           | <i>Alauda arvensis</i>           | 650-950                         |                                         | Bv         | a     |
| Feldschwirl          | <i>Locustella naevia</i>         | 50-60                           | 4-10                                    | Bv         | a     |
| Feldsperling         | <i>Passer montanus</i>           | 660-950                         | 350-500                                 | Bv         | a     |
| Fichtenkreuzschnabel | <i>Loxia curvirostra</i>         | 5-20                            | 3-9                                     | sBv        | a     |
| Fitis                | <i>Phylloscopus trochilus</i>    | 450-620                         | 190-220                                 | Bv         | a     |
| Flussregenpfeifer    | <i>Charadrius dubius</i>         | 15-20                           | 0-3                                     | sBv        | a     |
| Gartenbaumläufer     | <i>Certhia brachydactyla</i>     | 170-250                         |                                         | Bv         | k     |
| Gartengrasmücke      | <i>Sylvia borin</i>              | 500-700                         |                                         | Bv         | k     |
| Gartenrotschwanz     | <i>Phoenicurus phoenicurus</i>   | 560-750                         |                                         | Bv         | k     |
| Gänsesäger           | <i>Mergus merganser</i>          | 0                               | 2-4                                     | Bvn        | z     |
| Gebirgsstelze        | <i>Motacilla cinerea</i>         | 80-100                          | 80-115                                  | Bv         | u     |
| Gelbspötter          | <i>Hippolais icterina</i>        | 160-220                         | 60-90                                   | Bv         | a     |
| Gimpel               | <i>Pyrrhula pyrrhula</i>         | 100-140                         | 90-130                                  | Bv         | a     |
| Girlitz              | <i>Serinus serinus</i>           | 400-560                         |                                         | Bv         | k     |
| Goldammer            | <i>Emberiza citrinella</i>       | 340-430                         |                                         | Bv         | z     |

| Artnamen (deutsch) | Artnamen (wissenschaftl.)            | Brutbestand<br>1997-2000 (2004) | geschätzter<br>Brutbestand<br>2022-2024 | Status       | Trend |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|
| Graumammer         | <i>Emberiza calandra</i>             | 0-1                             | 1-3                                     | sBv          | u     |
| Gaugans            | <i>Anser anser</i>                   | 0                               | 0-1                                     | wBv          | u     |
| Graureiher         | <i>Ardea cinerea</i>                 | 6-12                            | 15-25                                   | Bv           | z     |
| Grauschnäpper      | <i>Muscicapa striata</i>             | 120-170                         |                                         | Bv           | k     |
| Grauspecht         | <i>Picus canus</i>                   | 1-0                             | 5-10                                    | Bv           | z     |
| Grünfink           | <i>Carduelis chloris</i>             | 1.500-2.400                     |                                         | Bv           | a     |
| Grünspecht         | <i>Picus viridis</i>                 | 20-30                           | 80-110                                  | Bv           | z     |
| Habicht            | <i>Accipiter gentilis</i>            | 6-8                             | 5-7                                     | Bv           | u     |
| Halsbandschnäpper  | <i>Ficedula albicollis</i>           | 0-1                             | 0                                       | eBv (2004)   | k     |
| Haubenmeise        | <i>Parus cristatus</i>               | 150-220                         | 100-150                                 | Bv           | a     |
| Haubenlerche       | <i>Galerida cristata</i>             | 0                               |                                         | eBv (1975)   | k     |
| Haubentaucher      | <i>Podiceps cristatus</i>            | 0-1                             | 3-5                                     | Bv           | z     |
| Hausrotschwanz     | <i>Phoenicurus ochruros</i>          | 940-1.300                       |                                         | Bv           | k     |
| Hausperling        | <i>Passer domesticus</i>             | 3.400-5.000                     |                                         | Bv           | k     |
| Heckenbraunelle    | <i>Prunella modularis</i>            | 340-500                         |                                         | Bv           | k     |
| Höckerschwan       | <i>Cygnus olor</i>                   | 1-3                             | 2-4                                     | Bv           | u     |
| Hohltaube          | <i>Columba oenas</i>                 | 6-8                             | 15-30                                   | Bv           | z     |
| Jagdfasan          | <i>Phasianus colchicus</i>           | 0                               | 0-1                                     | sBv          | u     |
| Kanadagans         | <i>Branta canadensis</i>             | 0                               |                                         | eBv (1980er) | k     |
| Kernbeißer         | <i>Coccothraustes coccothraustes</i> | 300-420                         |                                         | Bv           | k     |
| Kiebitz            | <i>Vanellus vanellus</i>             | 1-2                             | 0                                       | eBv (2004)   | k     |
| Klappergrasmücke   | <i>Sylvia curruca</i>                | 450-650                         |                                         | Bv           | k     |
| Kleiber            | <i>Sitta europaea</i>                | 650-940                         |                                         | Bv           | k     |
| Kleinspecht        | <i>Dryobates minor</i>               | 30-50                           | 30-40                                   | Bv           | a     |
| Knäkente           | <i>Anas querquedula</i>              | 0-1                             |                                         | eBv (2004)   | k     |
| Kohlmeise          | <i>Parus major</i>                   | 3.400-5.100                     |                                         | Bv           | k     |
| Kolkrabe           | <i>Corvus corax</i>                  | 5-7                             | 15-30                                   | Bv           | z     |
| Kuckuck            | <i>Cuculus canorus</i>               | 20-30                           | 15-25                                   | Bv           | a     |
| Lachmöwe           | <i>Larus ridibundus</i>              | 1-3                             | 0-4                                     | sBV          | u     |
| Mandarinente       | <i>Aix galericulata</i>              | 0-1                             | 6-11                                    | Bvn          | z     |
| Mauersegler        | <i>Apus apus</i>                     | 1.600-2.100                     |                                         | Bv           | z     |
| Mäusebussard       | <i>Buteo buteo</i>                   | 80-120                          | 80-120                                  | Bv           | a     |
| Mehlschwalbe       | <i>Delichon urbicum</i>              | 400-530                         |                                         | Bv           | k     |
| Misteldrossel      | <i>Turdus viscivorus</i>             | 65-85                           | 65-90                                   | Bv           | u     |
| Mittelspecht       | <i>Dendrocopos medius</i>            | 0                               | 2-3                                     | Bvn          | u     |
| Mönchsgrasmücke    | <i>Sylvia atricapilla</i>            | 1.200-1.800                     |                                         | Bv           | k     |
| Nachtigall         | <i>Luscinia megarhynchos</i>         | 1-3                             | 15-20                                   | Bv           | z     |
| Neuntöter          | <i>Lanius collurio</i>               | 160-180                         |                                         | Bv           | z     |
| Nilgans            | <i>Alopochen aegyptiaca</i>          | 0                               | 4-8                                     | Bvn          | z     |
| Pirol              | <i>Oriolus oriolus</i>               | 4-6                             | 25-40                                   | Bv           | z     |
| Rabenkrähe         | <i>Corvus corone</i>                 | 450-630                         |                                         | Bv           | z     |
| Raubwürger         | <i>Lanius excubitor</i>              | 0                               |                                         | eBv (1972)   | k     |
| Raufußkauz         | <i>Aegolius funereus</i>             | 0-1                             |                                         | eBv (2004)   | k     |
| Rauchschwalbe      | <i>Hirundo rustica</i>               | 400-500                         | 250-370                                 | Bv           | a     |
| Rebhuhn            | <i>Perdix perdix</i>                 | 4-8                             | 0                                       | eBv (2004)   | k     |
| Reiherente         | <i>Aythya fuligula</i>               | 15-25                           | 5-9                                     | Bv           | a     |
| Ringeltaube        | <i>Columba palumbus</i>              | 600-900                         |                                         | Bv           | z     |
| Rohrhammer         | <i>Emberiza schoeniclus</i>          | 30-50                           | 5-9                                     | Bv           | a     |

| Artnamen (deutsch) | Artnamen (wissenschaftl.)         | Brutbestand<br>1997-2000 (2004) | geschätzter<br>Brutbestand<br>2022-2024 | Status     | Trend |
|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| Rohrweihe          | <i>Circus aeruginosus</i>         | 0-1                             | 0-1                                     | wBv        | u     |
| Rotkehlchen        | <i>Erithacus rubecula</i>         | 870-1.270                       |                                         | Bv         | k     |
| Rotmilan           | <i>Milvus milvus</i>              | 3-5                             | 10-15                                   | Bv         | z     |
| Schlagschwirl      | <i>Locustella fluviatilis</i>     | 1-3                             | 1-4                                     | Bv         | u     |
| Schleiereule       | <i>Tyto alba</i>                  | 0-1                             | 0-2                                     | Bv         | u     |
| Schnatterente      | <i>Mareca strepera</i>            | 0                               | 0-1                                     | wBv        | k     |
| Schwanzmeise       | <i>Aegithalos caudatus</i>        | 140-180                         |                                         | Bv         | z     |
| Schwarzkehlchen    | <i>Saxicola rubicola</i>          | 0-1                             | 5-10                                    | Bv         | z     |
| Schwarzmilan       | <i>Milvus migrans</i>             | 0-1                             | 2-4                                     | Bv         | z     |
| Schwarzspecht      | <i>Dryocopus martius</i>          | 3-5                             | 15-20                                   | Bv         | z     |
| Schwarzstorch      | <i>Ciconia nigra</i>              | 0-1                             | 0-1                                     | wBv        | u     |
| Singdrossel        | <i>Turdus philomelos</i>          | 700-950                         |                                         | Bv         | k     |
| Sommergoldhähnchen | <i>Regulus ignicapilla</i>        | 350-500                         |                                         | Bv         | u     |
| Sperber            | <i>Accipiter nisus</i>            | 25-35                           | 15-25                                   | Bv         | a     |
| Sperbergrasmücke   | <i>Sylvia nisoria</i>             | 1-3                             | 0-1                                     | sBv        | u     |
| Sperlingskauz      | <i>Glaucidium passerinum</i>      | 1-2                             | 1-2                                     | Bv         | u     |
| Star               | <i>Sturnus vulgaris</i>           | 2.700-4.200                     |                                         | Bv         | k     |
| Steinkauz          | <i>Athene noctua</i>              | 0                               |                                         | eBv (1969) | k     |
| Steinschmätzer     | <i>Oenanthe oenanthe</i>          | 0                               |                                         | eBv (1973) | k     |
| Stieglitz          | <i>Carduelis carduelis</i>        | 320-460                         |                                         | Bv         | z     |
| Stockente          | <i>Anas platyrhynchos</i>         | 360-520                         |                                         | Bv         | a     |
| Straßentaube       | <i>Columba livia f. domestica</i> | 900-1.200                       |                                         | Bv         | k     |
| Sumpfbeise         | <i>Parus palustris</i>            | 60-80                           | 70-90                                   | Bv         | u     |
| Sumpfrohrsänger    | <i>Acrocephalus palustris</i>     | 400-550                         |                                         | Bv         | a     |
| Tafelente          | <i>Aythya ferina</i>              | 0-1                             | 1-2                                     | Bvn        | u     |
| Tannenhäher        | <i>Nucifraga caryocatactes</i>    | 1-3                             | 1-3                                     | Bv         | u     |
| Tannenmeise        | <i>Parus ater</i>                 | 330-460                         |                                         | Bv         | k     |
| Teichhuhn          | <i>Gallinula chloropus</i>        | 9-13                            | 8-14                                    | Bv         | u     |
| Teichrohrsänger    | <i>Acrocephalus scirpaceus</i>    | 12-16                           | 10-17                                   | Bv         | u     |
| Trauerschnäpper    | <i>Ficedula hypoleuca</i>         | 350-500                         |                                         | Bv         | k     |
| Tüpfelsumpfhuhn    | <i>Porzana porzana</i>            | 1                               | 0                                       | eBv (2004) | k     |
| Türkentaube        | <i>Streptopelia decaocto</i>      | 350-520                         | 100-175                                 | Bv         | a     |
| Turmfalke          | <i>Falco tinnunculus</i>          | 90-120                          | 100-125                                 | Bv         | u     |
| Turteltaube        | <i>Streptopelia turtur</i>        | 8-14                            | 0-2                                     | Bv         | a     |
| Uhu                | <i>Bubo bubo</i>                  | 0                               | 0-1                                     | wBv        | u     |
| Wacholderdrossel   | <i>Turdus pilaris</i>             | 550-790                         |                                         | Bv         | k     |
| Wachtel            | <i>Coturnix coturnix</i>          | 10-30                           | 10-25                                   | Bv         | a     |
| Wachtelkönig       | <i>Crex crex</i>                  | 1-3                             | 0-4                                     | Bv         | u     |
| Waldbaumläufer     | <i>Certhia familiaris</i>         | 170-230                         |                                         | Bv         | k     |
| Waldkauz           | <i>Strix aluco</i>                | 30-50                           | 28-45                                   | Bv         | a     |
| Waldlaubsänger     | <i>Phylloscopus sibilatrix</i>    | 90-120                          | 50-80                                   | Bv         | a     |
| Waldohreule        | <i>Asio otus</i>                  | 30-50                           | 20-30                                   | Bv         | a     |
| Waldschnepfe       | <i>Scolopax rusticola</i>         | ?                               | 0-2                                     | wBv        | u     |
| Wandfalke          | <i>Falco peregrinus</i>           | 0                               | 3-4                                     | Bvn        | z     |
| Wasserralle        | <i>Rallus aquaticus</i>           | 0                               | 0-1                                     | wBv        | u     |
| Wasseramsel        | <i>Cinclus cinclus</i>            | 5-9                             | 8-13                                    | Bv         | u     |
| Weidenmeise        | <i>Parus montanus</i>             | 130-180                         | 30-50                                   | Bv         | a     |
| Wendehals          | <i>Jynx torquilla</i>             | 0                               | 10-20                                   | Bv         | z     |
| Weißstorch         | <i>Ciconia ciconia</i>            | 1                               | 2-3                                     | Bv         | z     |

| Artnamen (deutsch) | Artnamen (wissenschaftl.)      | Brutbestand<br>1997-2000 (2004) | geschätzter<br>Brutbestand<br>2022-2024 | Status     | Trend |
|--------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------|-------|
| Wespenbussard      | <i>Perisoreus apivorus</i>     | 2-4                             | 1-2                                     | sBv        | u     |
| Wiesenpieper       | <i>Anthus pratensis</i>        | 10-15                           | 0                                       | eBv (2012) | k     |
| Wiesenschafstelze  | <i>Motacilla flava</i>         | 1                               | 2-4                                     | Bv         | z     |
| Wiedehopf          | <i>Upupa epops</i>             | 0                               | 0-2                                     | wBv        | u     |
| Wintergoldhähnchen | <i>Regulus regulus</i>         | 340-450                         | 150-215                                 | Bv         | a     |
| Zaunkönig          | <i>Troglodytes troglodytes</i> | 590-840                         |                                         | Bv         | k     |
| Zilpzalp           | <i>Phylloscopus collybita</i>  | 1.250-1.900                     |                                         | Bv         | k     |
| Ziegenmelker       | <i>Caprimulgus europaeus</i>   | 0                               |                                         | eBv (1990) | k     |
| Zwergtaucher       | <i>Tachybaptus ruficollis</i>  | 2-6                             | 4-8                                     | Bv         | u     |

| Status |                                        | Summe |
|--------|----------------------------------------|-------|
| Bv     | regelmäßiger Brutvogel                 | 103   |
| Bvn    | Brutvogel neu nach 2004                | 7     |
| sBv    | sporadischer Brutvogel                 | 8     |
| wBv    | wahrscheinlicher Brutvogel             | 8     |
| eBv    | ehemaliger Brutvogel (mind. bis zum Ja | 15    |
|        |                                        | 141   |

| Trend |                                | Summe |
|-------|--------------------------------|-------|
| a     | abnehmend                      | 33    |
| z     | zunehmend                      | 28    |
| u     | unbestimmt/gleichbleibend      | 33    |
| k     | keine Einschätzung vorgenommen | 47    |
|       |                                | 141   |

## Dank

Für fachliche Hinweise und die kritische Durchsicht des Manuskriptes gilt Herrn Dr. Kai Gedeon (Halle) herzlicher Dank.

## Literatur

Culs, K. (2019): Die Delphi-Methode – eine Einführung. In: Delphi-Verfahren in den Sozial- und Gesundheitswissenschaften: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 2019.  
 Flöter, E., D. Saemann & J. Börner (2006): Brutvogelatlas der Stadt Chemnitz – Mitt. Ver. Sächs. Ornithol. 9 Sonderh. 4  
 Flöter, E. und R. Steffens (2023): Brutvögel sächsischer Großstädte. – Der Falke 9/23 S.38-43  
 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) (2015): Rote Liste der Wirbeltiere in Sachsen; Internet: <http://www.snul.sachsen.de/lfulg>  
 Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) (2024): „In Sachsen auftretende Vogelarten 3.3“ (Stand 09.04.2024)